

In Österreich zur Behandlung der Fasziole zugelasene Tierarzneimittel:

Produkt	Wirkstoff	ZNr.	Dosierung	WZ Fleisch	WZ Milch	Wirksamkeit		
						junge immature	ältere immature	adulte
Albendazol-aniMedica 100 mg/ml Suspension zum Eingeben für Rinder	Albendazol	800498	10mg/kg KG entspr. 10ml/100kg KG	21	5	-	-	++
Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml Lösung zum Aufgießen für Rinder	Triclabendazol	801044	20mg/kg KG entspr. 1ml/10kg KG	143	Bei Rindern, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, in keinem Alter anwenden.	++	++(+)	+++
Tribex 100 mg/ml - Suspension zum Eingeben für Rinder	Triclabendazol	800535	12mg/kg KG entspr. 12ml/100kg KG	56	Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Milchkühe, die Milch für den menschlichen Verzehr liefern, sollten lediglich am Anfang der Trockenstehzeit behandelt werden.	++	++(+)	+++
Closamectin 5 mg/ml + 200 mg/ml Pour-on Lösung für Rinder	Closantel	800958	20mg/kg KG entspr. 1ml/10kg KG	28	Nicht bei Rindern verwenden, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren. Nicht bei trächtigen Tieren verwenden, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren.	-	-	+++
Closamectin 5 mg/ml/125 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schafe	Closantel	800735	5mg/kg KG entspr. 1ml/25kg KG	49	Nicht bei Kühen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist einschließlich der Trockenstehperiode. Nicht im letzten Trimester der Trächtigkeit von Färsen anwenden wenn sie dafür vorgesehen sind Milch für den menschlichen Verzehr zu produzieren.	-	-	+++

Flukiver 50 mg/ml Injektionslösung für Rinder	Closantel	800911	2,5-5,0mg/kg KG entspr. 1-2ml/20kg KG	77	Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, einschließlich trächtiger Tiere die für die Milchproduktion zur Lebensmittelgewinnung bestimmt sind.	-	-	+++
--	-----------	--------	--	----	--	---	---	-----

Levatum Fluke 10/100 mg/ml Injektionslösung für Rinder	Clorsulon	800977	2mg/kg KG entspr. 1ml/50kg KG	66	Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei Milchkühen in der Trockenstehzeit anwenden, einschließlich tragenden Färsen innerhalb von 60 Tagen vor der Kalbung.	-	-	++(+)
Valbazen 100 mg/ml - Suspension zum Eingeben für Rinder	Albendazol	800316	10mg/kg KG entspr. 10ml/100kg KG	28	5	-	-	++