

Übersicht der Anthelminthika beim Schaf (2017): Wirkstoffgruppen, Wirkstoffe und Handelspräparate sowie deren Indikationen

Wirkstoffgruppe	Wirkstoffe	Handelsnamen	Verabreichung	Firma	Wartezeit (Tage)		Wirkungsspektrum ¹					
					essbares Gewebe	Milch	Magen-Darm-Würmer	Bandwürmer	große Lungenw.	kleine Lungenw.	große Leberegel	kleine Leberegel
Benzimidazole und Probenzimidazol	Netobimin	Hapadex [®]	Drench	Intervet	6	5	● ²	●	●	○	○	○
	Fenbendazol	Panacur Susp.2,5 % [®]	Drench	Intervet	16	8	● ²	○	●	-	-	-
		Panacur Boli250mg [®]	Tablette	Intervet	19	7	● ²	○	●	-	-	-
Oxfendazol	Interzol [®]	Pulver	Alvetra	14	5	● ²	●	●	-	-	-	
Makrozyklische Laktone	Ivermectin 10mg/ml (x)	Bimectin [®]	Injektion	Crossvet-pharm	42	X	● ²	-	●	-	-	-
		Ecomectin [®]	Injektion	Eco Anim. H	42	X	● ²	-	●	-	-	-
		Ivomec [®]	Injektion	Merial	22	X	● ²	-	●	-	-	-
		Noromectin [®]	Injektion	Norbrook	35	X	● ²	-	●	-	-	-
	Virbamec [®]	Injektion	Virbac	42	X	● ²	-	●	-	-	-	
Moxidectin	Cydectin [®] orale Lsg.	Drench	Zoetis	14	8	● ²	-	●	-	-	-	
Amino-Acetonitril Derivate (AAD)	Monepantel	Zolvix [®]	Drench	Novartis	7	X	●	-	-	-	-	-
Kombinationspräparate	Closantel+ Mebendazol	Flukiver Combi [®]	Drench	Elanco	65	X	● ²	●	●	-	●	-
	Closantel+ Ivermectin	Closamectin [®]	Injektion	Norbrook	28	X	● ²	●	●	-	●	-
Kombinationspräparate	Moxidectin+ Triaclobendazol	Cydectin TriclaMox [®]	Drench	Zoetis	31	X	● ²	-	●	-	●	-

(x) Ivermectin ist sowohl gegen die hier aufgeführten Innenparasiten als auch gegen Außenparasiten, wie Dasselfliegen, Läuse und Räudemilben wirksam.

Für **Ziegen** ist momentan **kein** Präparat zugelassen. Schafpräparate oder z.B. Eprinex[®] pour on von Merial (für Rind zugelassen) können nach Umwidmung angewendet werden. Dabei die Dosis 100% erhöhen. Nach Umwidmung Wartezeit Milch mindestens 7 Tage und für essbares Gewebe mind. 28 Tage.

In der Ökologischen Tierhaltung ist Wartezeit zu verdoppeln; ist keine Wartezeit angegeben dann 48 Stunden

X Hinweis: Nicht bei Schafen anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist

¹ Wirksamkeit gegen erwachsene Würmer: ● wirksam; ○ Teilwirkung oder nur in erhöhter Dosis ausreichend wirksam

- nicht wirksam oder nicht geprüft ●² nur wirksam, wenn keine resistenten Wurmstämme in der Herde auftreten

Nicht Wirkstoffe, sondern Wirkstoffgruppen wechseln! Behandlungskontrolle nicht vergessen (10-14 Tage nach Entwurmung)

Quelle: www.sprengler.basg.gv.at